

Butlletí Setmanal

Consells al pacient



Per què tornen els clients a la nostra farmàcia?

Aquests són els tres motius:

- 1.- La recomanació del personal
- 2.- Confiança i credibilitat
- 3.- Qualitat de producte

Quan un pacient entra a la nostra farmàcia a buscar medicaments **donem-li consell dels medicaments** que es porta.

Avui veurem com podem veure els consells dels medicaments amb **Nixfarma**

Consells en vendes

Des de l'opció de Vendes.

Nixfarma - [NXF] - [Ventas]

Acción Ventas Bdatos Compras Almacén Artículos Recetas Especiales Configuración Gestión Areas Ventana Ayuda

Ventas
jueves 01 de junio de 2017 10:26

Operador* CAJA1 Última venta 5,37 Cambio 0,00 Vta NXF 1

Tipo	Artículo	Descripción	Und.	P.V.P.	Aportación	L
E6	651461	SIMVASTATINA RATIO EFG 10 MG 28 COMPRIMI	1	0,95	0,48	
E2	720011	ATROVENT 20 MCG/PULSACION 1 AEROSOL 200	1	5,37	0,54	
E2	797183	SALBUTAMOL ALDO UNION EFG 100 MCG/PULSAC	1	2,69	0,27	

Consells al pacient


ATROVENT 20MCG/DOS 200 DOSIS 10ML SOLUCION INHALACION ENV A PRESION

Almacén Precios

Fem clic a la icona de **Consells al pacient**.

Consells en vendes

Finalment se'ns mostrarà una finestra amb els consells pertinents:



Consejos al paciente

Artículo	Descripción
720011	ATROVENT 20 MCG/PULSACION 1 AEROSOL 200 DOSIS


CONSEJOS AL PACIENTE

- No debe usarse como medicación de rescate en casos de espasmo bronquial agudo.
- Antes de proceder a la administración, asegúrese de conocer perfectamente la forma de utilización de los dispositivos de inhalación, y el mecanismo para inhalar adecuadamente el medicamento.
- Evitar que el medicamento entre en contacto con los ojos.
- Consulte con su médico y/o farmacéutico si nota que su tratamiento le hace cada vez menos efecto, como por ejemplo un peor control de los síntomas o mayor necesidad de utilizar otros broncodilatadores de acción rápida.
- Advierta a su médico y/o farmacéutico si experimenta síntomas como:
 - * Jadeos, ruidos o dificultad para respirar tras su administración.
 - * Alteraciones de la visión o sequedad de boca.
 - * Erupciones en la piel, picor, hinchazón de los labios o la cara o cualquier otro síntoma de alergia.

Aceptar

Consell en vendes

Podem anar a veure tants consells com articles tinguem a la venda.



Consejos al paciente

Artículo	Descripción
797183	SALBUTAMOL ALDO UNION EFG 100 MCG/PULSACION 1 AEROSOL 200 DOSIS

CONSEJOS AL PACIENTE

- Este medicamento debe administrarse sólo cuando aparezcan síntomas de asma.
- El paciente debe ser instruido en la correcta inhalación del medicamento.
- La inspiración debe ser lenta y constante para favorecer la llegada de las partículas al pulmón.
- Si el paciente requiriese más de una inhalación, deberá esperar al menos un minuto entre cada dosis.
- Tras la administración, se recomienda enjuagarse la boca con agua.
- Es muy importante no superar la dosis adecuada.
- Se debe advertir al médico si el paciente presenta enfermedades de corazón, diabetes, síntomas como nerviosismo, insomnio, cefalea, palpitaciones, calambres o debilidad muscular, si se requieren más dosis de las habituales para eliminar los síntomas o si tras administrar una dosis, no aparece mejora a las tres horas.
- Si aparecen jadeos o ruidos al respirar tras administrar este medicamento, se recomienda acudir inmediatamente al médico.

Aceptar

#TotsSomBarcelona

El nostre suport a les víctimes de Barcelona i Cambrils

